

Histoires Naturelles

n°5



Cyrille Deliry - Octobre 2017
Première édition - 2009

Liste des Reptiles de Rhône-Alpes

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - Orvet fragile - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun, plus fréquent en montagne, menacé en plaine. Ensemble de la région.

Chalcides striatus (Cuvier, 1829) - Seps strié - 07 26 - Très rare - Domaine méditerranéen.

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) - Caméléon - (38[^]) Indiqué, échappé dans la région de Grenoble. Ne s'est pas maintenu.

Coronella austriaca Laurenti, 1768 - Coronelle lisse - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun. Ensemble de la région, plus rare dans l'Ain, l'Ardèche et le Rhône.

Coronella girondica (Daudin, 1803) - Coronelle girondine - 01 07 26 38 42 69 (73? — Assez rare. En limite septentrionale de répartition. Elle est connue d'assez longue date de la région de Grenoble mais semble en expansion dans le nord de la région où les mentions se sont multipliées récemment.

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - Cistude d'Europe - 01 07 26 38 69 73 **X74** - Rare et localisé. Fort déclin à l'échelle séculaire. L'essentiel des populations viables de la région se maintient dans l'Isle Crémieu. Autrefois plus répandu, ce taxon occupait vraisemblablement l'ensemble de la Vallée du Rhône. Des populations relictuelles et mal étudiées existent en Ardèche méridionale. Par ailleurs des projets de réintroduction sont examinés en quelques points de la région, et sont appliqués sur le bassin du Lac du Bourget (Savoie). Indiquée au Bois des Glaisins et Annecy (Thabuis 1872).

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - Couleuvre verte et jaune - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun. Très localisé en Haute-savoie. Ensemble de la région.

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Lézard agile - 01 07 **26** 38 42 69 73 74 - Rare. L'espèce présente des populations isolées les unes des autres et se rencontre au sud, jusque dans la basse vallée de la Drôme. Très localisée en Isère et le Rhône (au plus 5 stations sur chaque département).

Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Lézard vert occidental - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun. Ensemble de la région.

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) - Couleuvre de Montpellier - 07 26 - Rare. Domaine méditerranéen (Ardèche et Drôme).

Natrix maura (Linnaeus, 1758) - Couleuvre vipérine - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun. Très localisé en Haute-Savoie (2 stations indiquées...). Ensemble de la région.

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Couleuvre à collier - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun. Ensemble de la région.

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - Couleuvre tesselée - (74) - Allochtone très rarement signalé, réputé présent sur les rives du Léman suisse, ce taxon doit vraisemblablement se trouver sur celles de la Haute-Savoie. Accidentellement contacté sur le Lac d'Annecy (Thabuis 1872 et récemment). Individus échappés, pas de population connue.

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) - Lézard catalan - 07 26 (38?) - Peu commun. Domaine méditerranéen. Localisé en Ardèche, remontant jusqu'aux vallons rhodaniens du Pilat dans la Loire.

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Lézard des murailles - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Commun. Ensemble de la région.

Psammodromus hispanicus Fintzinger, 1826 - Psammodrome d'Edwards - 26 - Rare. Domaine méditerranéen : très localisé au sud de la région (deux à trois stations indiquées récemment...), il remonte ponctuellement jusqu'aux environs de Romans-sur-Isère. Ses habitats sont fragiles.

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) - Couleuvre à échelon - 07 26 - Rare. Domaine méditerranéen. Très localisé dans la Drôme (2 stations).

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) - Tarente de Maurétanie - 07 26 38 **69** - Très rare. Domaine méditerranéen. Progression saltatoire d'une localité à une autre favorisée par le caractère anthropophile de l'espèce. Deux ou trois populations semblent correctement installées dans la Basse Vallée du Rhône (Ardèche : Cruas, égaré (?) sur Les Vans ; Drôme : Pierrelatte, Valence). L'espèce remonte jusque dans la région lyonnaise (ponctuellement) et au niveau de Condrieu (petite population révélée en 2015). Plus au nord, par exemple en Isère (Grenoble), l'acclimatation de l'espèce a jusqu'à ce jour échoué (instable dans le domaine alpin).

Timon lepidus (Daudin, 1802) - Lézard ocellé - 07 26 **X38** - Rare, en fort déclin. Domaine méditerranéen, semble disparu des domaines alpin et continental. La disparition de ce taxon méridional est envisagée à relativement court terme dans la Drôme. La limite septentrionale d'aire ne semble plus occupée dans le Royans (Isère), mais l'espèce a récemment été indiquée à Tain-l'Hermitage (Drôme) dans la Moyenne Vallée du Rhône où elle est réputée remonter jusqu'au niveau de Vienne. Très localisée dans la Drôme (5 stations indiquées).

Trachemys scripta (Schoepff, 1792) - Tortue de Floride - 01 07 26 38 42 69 **73 74** - Allochtone en nette augmentation, tend à devenir d'assez rare à peu commun. De plus en plus fréquemment signalé, ce taxon est introduit maladroitement par les propriétaires d'animaux de compagnie qui s'en débarrassent dans l'environnement une fois les individus devenus adultes. Présent localement dans la Vallée de l'Ain, en Dombes (Ain), commun dans la Basse Vallée du Rhône entre St Péray et Rochemaure, ponctuellement sur la rivière Ardèche (Ardèche), en augmentation nette dans la Drôme où la création du moindre plan d'eau se traduit par l'observation rapide de l'espèce, très présent sur les plans d'eau du Forez et du Roannais (Loire), abondant sur tout le cours du Rhône et de la Saône, où la reproduction est probable au Parc de la Tête d'Or (Rhône), ubiquiste sur les plans d'eau de plaine de la Savoie, sa reproduction étant avérée vers le Lac du Bourget, présent en Haute-Savoie

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) - Vipère aspic - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun. Ensemble de la région.

Vipera berus (Linnaeus, 1758) - Vipère péliade - 07 42 74 - Rare. Essentiel des populations dans le Massif Central. Indiqué dès le XIX^{ème} siècle en Haute-Savoie (Thabuis 1872), sa présence n'a été confirmée que très récemment sur ce département ; elle est néanmoins à confronter à *Vipera nalsler* sur ce secteur. Mentions douteuses pour l'Ain et l'Isère.

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - Couleuvre d'Esculape - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun. Ensemble de la région, plus rare dans l'Ain, l'Isère et le Rhône.

Zootoca vivipara (Von Jacquin, 1787) - Lézard vivipare - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun, en montagne. Très localisé dans le Rhône (une station).

Références

- Castanet J. & Guyetant R. (dir.) 1989** - *Atlas de la répartition des Amphibiens et Reptile de France.* - SHF, Paris : 191 pp.
- Deliry C. (coord.) 2002** - Reptiles et Amphibiens de Rhône-Alpes. Atlas préliminaire. - *Le Bièvre*, hors série n°1 : 146 pp.
- Duquet M. & Maurin H. 1992** - *Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux Invertébrés.* - MNHN, Nathan : 415 pp.
- Gasc J.P. (dir.) 1997** - *Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe.* - SEH, MNHN, Paris : 496 pp.
- INPN 2005** - *Inventaire National du Patrimoine Naturel. Tableau de référence de la faune.* - ([www] - 6 septembre 2005).
- Maurin H. (dir.) 1994** - *Inventaire de la faune menacée de France.* - WWF, MNHN, Nathan, Paris : 176 pp.
- Thabuis J. 1872** - Catalogue des Reptiles des environs d'Annecy. - *Revue Savoisienne*, 12ème année : 80-81 et 87-89



Histoires Naturelles © 2009-2017

Les *Histoires Naturelles* rassemblent des informations et donnent un état des lieux aussi avancé que possible sur une question, un sujet, une liste d'espèces ou un catalogue... Elles ne traitent généralement que d'un seul sujet ou un seul thème à la fois.

Illustration de couverture

Lézard vert occidental (*Lacerta bilineata*)

Serpaize (Isère) - 3 avril 2008 © C.Deliry